レジメン名	CBDCA+GEM triweekly(イメンド併用)				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	3週間
				投与予定回数	3～4コース
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制		G-CSF投与
その他	悪心・嘔吐		制吐剤の投与
	発熱		解熱剤の投与

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													
2	生食 プロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h		●																				
3	デキサート 生食	4.95mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
4	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴静注	200mL/h									●													
5	ゲムシタビン 生食	1000mg/㎡ 100mL	点滴静注	200mL/h		●							●													
6	カルボプラチン 5%ブドウ糖液注	AUC=5 250mL	点滴静注	300mL/h		●																				
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	5－HT_3受容体拮抗薬					●																				