レジメン名	PBR療法　2コース目以降				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	6
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	65.7%	休薬することがある
	血小板減少	51.4%	同上
	貧血	45.7%	同上
その他	感染症	40.0%	抗菌薬投与など
	末梢性ニューロパチー	14.3%	休薬することがある
	infusion reaction	25.7%	同上

レジメン内容（支持療法を含む）

	2021/6/28				day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●																			
2	トレアキシン 注射用水 生理食塩液	90mg/m^2 36mL/m^2 250mL	点滴静注	60分		●	●																			
3	ポララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	30分		●																				
4	リツキシマブ BS 生理食塩液	375mg/m^2 337.5mL/m^2	点滴静注	100mg/hから開始可、医師の指示により30分毎100mg/hずつ上げて400mg/hまで		●																				
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●																				
6	ボライビー 注射用水 生理食塩液	1.8mg/kg 0.09mL/kg 100mL(体重40kg未満は50mL)	点滴静注	30分あるいは90分		●																				
7	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●																			

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	イブプロフェン	200mg	リツキシマブ30分前			●																				
2	カイトリル	2mg	トレアキシン30分前			●	●																			
3	ニューモシスチス予防																									
4	帯状疱疹予防																									