

レジメン名		GEM(隔週)+S-1			
対象がん種	胆道がん	対象患者	嘔吐リスク	軽度	
	膵がん		1コースの日数	28日間	
内服抗がん剤の有無	あり		投与予定回数	PDまで	
※有の場合薬剤名	TS-1		投与回数上限	なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		
その他		

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h									•														•								
2	生食 デキサート	100 ml 6.6 mg	点滴静注	200 ml/h									•														•								
3	生食 ゲムシタピン	100 ml 1000 mg/m ²	点滴静注	200 ml/h									•														•								

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	S-1	40~60 mg/回	1日2回		••	••	••	••	••	••	••								••	••	••	••	••	••	••									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml/h
	100 ml/h

②

点滴静注

生食	100 ml
デキサート	6.6 mg
	200 ml/h

③

点滴静注

生食	100 ml
ゲムシタピン	1000 mg/m ²
	200 ml/h

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要