レジメン名	アテゾリズマブ+ベバシズマブ				
対象がん種	肝臓がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少・発熱	6.4%	G1になるまで休薬
その他	高血圧	15.2%	G1になるまで休薬
	Infusion reaction	9.7%	中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				
2	アテゾリズマブ 生食	1200mg/body 250ml	点滴静注	初回60分、2回目以降30分		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●																				
4	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100ml	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目以降30分		●																				
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									