レジメン名	子宮頚癌　TC療法　AUC5				
対象がん種	子宮頸がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
2	デキサート ガスター ボララミン 生食	8.25mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				
4	パクリタキセル 5%ブドウ糖	175mg/㎡ 500mL	点滴静注	3時間		●																				
5	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC：5 250mL	点滴静注	1時間		●																				
6	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	グラニセトロン	2mg/day	投与前内服			●																				
2	イメンド	125mg/day	投与前内服			●																				
3	イメンド	80mg/day	分1				●	●																		
4	デカドロン	8mg/day	分2				●●	●●																		