レジメン名	（皮下注）アザシチジン療法				
対象がん種	骨髄異形成症候群	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	PDまで
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	88.7%	減量することがある
	血小板減少	86.8%	同上
	貧血	73.6%	
その他	便秘	69.8%	下剤
	注射部位反応	67.9%	ステロイド外用薬、抗ヒスタミン薬内服

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	ビダーザ 注射用水	75mg/m2 3ml/m2	皮下注			●	●	●	●	●	●	●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンゼリー orカイトリル錠	2mg	化学療法前			●	●	●	●	●	●	●																					