

レジメン名	FOLFOX+Bmab(ペバシズマブ)			
対象がん種	大腸がん	対象患者	催吐リスク	中等度
			1コースの日数	14日間
			投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)			
項目	頻度%(Grade≥3)	対処法(減量・中止など)	
血液毒性	好中球減少	49.0%	
	白血球減少	7.0%	
	血小板減少	3.0%	
その他	疲労	13.0%	
	下痢	11.0%	
	知覚障害	11.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	50 mL	点滴静注	100 mL/h			●														休業完了
2	デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	ペバシズマブ 生食	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分、 2回目60分 3回目以降30分			●														
4	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h			●														
5	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間			●														
6	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
7	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-HT3拮抗薬(カイトリル又はアロキシ)		内服or点滴静注		●													
2	デカドロン錠	8mg/day	内服			●●	●●											

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②

点滴静注

デキサート プリンペラン 生食	9.9 mg 10 mg 100 mL
-----------------------	---------------------------

200 ml/h

③

点滴静注

ペバシズマブ 生食	5 mg/kg 100 mL
--------------	-------------------

備考欄参照

④

点滴静注

オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL
---------------------	--------------------------------

2時間

⑤

点滴静注

フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m ² 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 ml/h

⑥

点滴静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL
----------------	------------------------------------

46時間

軽度起炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

初回90分、2回目60分、

3回目以降は30分で投与

投与終了後生食フラッシュ

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

側管①と同時投与

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 ml/h

主管④と同時投与