レジメン名	PLD+CBDCA療法				
対象がん種	卵巣がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																										
2	デキサート 生食	4.95mg 100mL	点滴静注	100mL/h		●																										
3	ドキシル 5%ブドウ糖	30mg/㎡ 250mL	点滴静注	200mL/h		●																										
4	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC:5 250mL	点滴静注	1時間		●																										
5	生食	50mL	点滴静注	100mL/h		●																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロン	2mg/day	投与前内服			●																										
2	イメンド	125mg/day	投与前内服			●																										
3	イメンド	80mg/day	分1				●	●																								
4	デカドロン	8mg/day	分2				●●	●●																								