

レジメン名		GEM2投1休			
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無				投与予定回数	なし
				投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	95.2%
	貧血	71.0%
		0.0%
その他	ALT上昇	77.4%
	発熱	32.2%
	間質性肺炎	1.4%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													休薬完了
2	ゲムシタピン 生食	1250 mg/m ² 100 ml	点滴静注	200 ml/h			●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
	100 ml/h

②

ゲムシタピン	1250 mg/m ²
生食	100 ml
	200 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要