レジメン名	(共通)4週毎480mg オプジーボ(ニボルマブ)療法				
対象がん種	共通	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他	間質性肺炎	6.9%	Gradeに応じて延期・中止を考慮する。
	大腸炎	7.0%	Gradeに応じて延期・中止を考慮する。
	甲状腺機能低下症	16.2%	Gradeに応じて延期・中止を考慮する。

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																											
2	オプジーボ 生食	480mg 100ml	点滴静注	140ml/hr		●																											
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																