レジメン名	DKd療法　3-6コース目(D皮下注)				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者	再発・難治	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	4
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	レナデックス				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）			
項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	12.3%	休薬することがある
	血小板減少	9.2%	同上
	貧血	8.1%	同上
その他	infusion reaction	12.7%	中断、ステロイド投与など
	肺炎	3.8%	休薬することがある

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																											休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●						●	●						●	●											
2	カイプロリス ミズ 5%ブドウ糖	56mg/m2 28ml/m2 100mL	点滴静注	30分		●	●						●	●						●	●											
3	生理食塩液	50mL	点滴静注	30分		●	●						●	●						●	●											
4	ダラキューロ	15mL	皮下注	3-5分		●														●												

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	カロナール	900mg	ダラキューロ１時間前			●														●												
2	モンテルカスト	10mg	ダラキューロ１時間前			●														●												
3	アタラックスPカプセル	25mg	ダラキューロ１時間前			●														●												
4	レナデックス	20mg	1日1回（ダラキューロ１時間前）			●	●						●	●						●	●											
5	レナデックス	40mg	1日1回																								●					
6	他、適宜アシクロビル、ST合剤など																															