TAS-102(ﾛﾝｻｰﾌ) +ベバシズマブ

大腸がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	中等度
			1コースの日数	28日
			投与予定回数	PDまで
あり			投与回数上限	なし
TAS-102(ロンサーフ)				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	85.0%	1,000mm3未満:休薬　500mm3未満:減量
	貧血	67.0%	7.0g/dL未満 休薬
	血小板減少	39.0%	50,000mm3 未満　休薬、減量
その他	悪心	59.0%	Grade3以上 休薬
	嘔吐	35.0%	Grade3以上 休薬
	疲労	85.0%	

			day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
50 ml	点滴静注	100ml/h		●														●													
5 mg/kg 100 ml	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目 以降30分まで短縮可		●														●													
50 ml	点滴静注	100ml/h		●														●													

投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
35 mg/m^2/回	1日2回			●●	●●	●●	●●	●●			●●	●●	●●	●●	●●																