

レジメン名	テムシロリムス療法				
対象がん種	腎細胞がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	7
内服抗がん剤の有無	なし			投与予定回数	
※有の場合薬剤名				投与回数上限	規定なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	32.1%
	血小板減少	17.9%
	白血球減少	9.0%
その他	口内炎	37.6%
	高血糖	26.2%
	間質性肺炎	6.2%

レジメン内容(支持療法を含む)

				day	1	2	3	4	5	6	7
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)						休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/hr		●					
2	ポラミン注 生食	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr		●					
3	トーリセル 生食	25mg 250mL	点滴静注	1時間		●					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7
1	なし										

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50mL
----	------

100 ml/h

②

ポラミン注	5mg
生食	50mL

100 ml/h

③

トーリセル	25mg
生食	250mL

60分

炎症性

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要