

レジメン名	GEM+CDDP25mg/m2(2投1休3週コース・補助療法)				
対象がん種	胆道がん	対象患者		催吐リスク	高度
				1コースの日数	21日間
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	白血球減少	87.8%
	好中球減少	82.9%
	血小板減少	80.5%
その他	吐き気	68.3%
	発熱	43.9%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	200 ml/h			●							●													休薬完了
2	生食	500 ml	点滴静注	250 ml/h			●							●													
3	生食 デキサート プロイメンド	100 ml 9.9 mg 150 mg	点滴静注	100 ml/h			●							●													
4	生食	20 ml	静注				●							●													
5	生食 シスプラチン	total 150 ml 25 mg/m ²	点滴静注	75ml/h			●							●													
6	生食 ゲムシタピン	100 ml 800 mg/m ²	点滴静注	200 ml/h			●							●													
7	生食	500 ml	点滴静注	250 ml/h			●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	カイトリル	2 mg/回	内服		●							●														
2	デカドロン	4 mg/回	内服			●●	●●						●●	●●												

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50 ml
	200 ml/h

②
点滴静注

生食	100 ml
デキサート	9.9 mg
プロイメンド	150 mg
	100 ml/h

③
静注

生食	20 ml
----	-------

④
点滴静注

生食	total 150 ml
シスプラチン	25 mg/m ²
	75 ml/h

⑤
点滴静注

生食	100 ml
ゲムシタピン	800 mg/m ²
	200 ml/h

プロイメンドフラッシュ用

炎症性
フィルター不要
バッグは遮光、ルートは遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	500 ml
	250 ml/h

②
点滴静注

生食	500 ml
	250 ml/h