

| レジメン名 | ペムプロリズマブ+CBDCA+PEM | | | |
|-----------|--------------------|------|----------|---------------|
| 対象がん種 | 肺がん | 対象患者 | 除不能進行・再発 | 催吐リスク 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 21 |
| | | | | 投与予定回数 4 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 6 |
| ※有の場合薬剤名 | | | | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | | |
|------------------------|----------|--------------|-----------------------------|
| 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) | |
| 血液毒性 | 貧血 | 38.0% | |
| | 好中球減少 | 24.9% | PEM副作用予防のためバンビタン内服、メチコパール筋注 |
| | 血小板減少 | 17.0% | |
| その他 | 悪心 | 46.2% | |
| | 腎障害 | - | |
| | 免疫関連有害事象 | - | |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|---------------------|-------------------------------|------|---------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 2 | キイトルーダ 生食 | 200mg 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | フロイメンド 生食 | 150mg 100mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | デキサート アロキシ 生食 | 4.95mg 0.75mg 100mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | アリムタ 生食 | 500mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 500mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | カルボプラチン 5%ブドウ糖注 | AUC=5 250mL | 点滴静注 | 1時間 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 200mL/h | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|--------|--------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | デカドロン錠 | 4mg/回 | 朝食後 | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | バンビタン末 | 1g/day | 朝食後 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

滴下順

主餐

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

① 点滴静注

| | |
|----|------|
| 生食 | 50mL |
|----|------|

100 ml/h

②

点滴静注

| | |
|--------------|---------------|
| キイトルーダ 生食 | 200mg 50mL |
|--------------|---------------|

100 ml/h

③

点滴静注

| | |
|----|------|
| 生食 | 50mL |
|----|------|

200 ml/h

④

点滴静注

| | |
|--------------|----------------|
| フロイメンド 生食 | 150mg 100mL |
|--------------|----------------|

200 ml/h

⑤

点滴静注

| | |
|---------------------|---------------------------|
| デキサート アロキシ 生食 | 4.95mg 0.75mg 100mL |
|---------------------|---------------------------|

200 ml/h

⑥

点滴静注

| | |
|------------|-------------------------------|
| アリムタ 生食 | 500mg/m ² 100mL |
|------------|-------------------------------|

500 ml/h

⑦

点滴静注

| | |
|--------------------|----------------|
| カルボプラチン 5%ブドウ糖注 | AUC=5 250mL |
|--------------------|----------------|

1時間

⑧

点滴静注

| | |
|----|------|
| 生食 | 50mL |
|----|------|

200 ml/h

フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不

フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不