

レジメン名	後発GEM(標準)3投1休			
対象がん種	膵がん	対象患者	嘔吐リスク	軽度
	胆道がん		1コースの日数	28日
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	PDまで
※有の場合薬剤名			投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)(grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	
	血小板減少	
	貧血	
その他	食欲不振	
	ALT上昇	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			•							•							•														休薬完了
2	生食 ゲムシタピン	100 ml 1000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	200 ml/h			•							•							•														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	なし																																		

滴下順

主餐

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食

50 ml

100 ml/h

②

点滴静注

ゲムシタピン

生食

1000 mg/m<sup>2</sup>

100 ml

200 ml/h

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要