

レジメン名	CBDCA+PEM+BV(ヘバシズマブ)			
対象がん種	肺がん	対象患者	催吐リスク	高度
			1コースの日数	3週間
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名			投与予定回数	4コース
			投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	91.2% G-CSF投与
	血小板減少	4.8% 輸血
	発熱性好中球減少	8.8% 抗菌薬の投与、G-CSF投与
その他	高血圧	11.2% 降圧薬の投与
	食欲不振	5.6%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h	投与時刻(必要時)	●																				休業完了	
2	生食 プロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h		●																					
3	デキササート 生食	4.95mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																					
4	アリムタ 生食	500mg/m ² 100mL	点滴静注	500mL/h		●																					
5	カルボプラチン 5% ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	250mL/h		●																					
6	ヘバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分、2回目 60分、3回目以降 30分		●																					
7	生食	50mL	点滴静注	200mL/h		●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠	4mg	朝・昼食後			●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50mL
----	------

100 ml/h

②
点滴静注

生食 プロイメンド	100mL 150mg
--------------	----------------

200 ml/h

③
点滴静注

デキササート 生食	4.95mg 100mL
--------------	-----------------

200 ml/h

④
点滴静注

アリムタ 生食	500mg/m ² 100mL
------------	-------------------------------

500 ml/h

⑤
点滴静注

カルボプラチン 5% ブドウ糖注	AUC=6 250mL
---------------------	----------------

1時間

⑥
点滴静注

ヘバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL
--------------	------------------

備考欄参照

⑦
点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h

軽度起炎性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度起炎性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降30分