レジメン名	GEM+DOC(隔週)												
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	軽度								
				1コースの日数	2週間								
				投与予定回数	4コース								
内服抗がん剤の有無				投与回数上限									
※有の場合薬剤名													

副作用情報(頻	頁度が高い、特徴的な副作	作用など)	
	項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	骨髄抑制	0.0%	G-CSF製剤の投与
		0.0%	
		0.0%	
その他	発熱	0.0%	解熱剤の内服
	浮腫	0.0%	利尿薬の内服
		0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度·時間	投与時刻(必要時)														休薬完了
	1 生食	50mL	点滴静注	100mL/h		•													
:	2 デキサート 生食	3.3mg 100mL	点滴静注	204mL/h		•													
:	3 5%ブドウ糖液 ドセタキセル	250mL 30mg/m²	点滴静注	250mL/h		•													
4	4 ゲムシタビン 生食	1000mg/m² 100mL	点滴静注	200mL/h		•													
_ ;	5 生食	50mL	点滴静注	100mL/h		•													

内服抗がん剤・支持療法薬

R	薬剤名	投与量	用法	 day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 なし															, ,		