レジメン名	ELd療法				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	レナリドミド				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	81.8%	Lenalidomide：休薬、減量
	貧血	96.2%	
	血小板減少	83.6%	Lenalidomide：休薬、減量
その他	infusion reaction	72.3%	添付文書参照
	間質性肺炎	2.2%	中止
	感染症	81.4%	休薬及び抗生剤の投与等

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						
2	生食 デキサート	50ml 6.6mg	点滴静注	500ml/h	エンプリシティ投与の45分前までに投与完了	●							●							●							●						
3	生食 ポララミン ガスター	50ml 5mg 20mg	点滴静注	100ml/h	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了	●							●							●							●						
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●							●							●							●						
5	エムプリシティ 注射用水 生食	10mg/kg 0.4ml/kg 250ml（体重50kg未満：150ml、体重50～90kg：250ml、体重90kg超：350ml）	点滴静注	初回投与 投与開始0～30分：30ml/h、投与開始30～60分：60ml/h、投与開始60分以降：120ml/h 2回目投与 投与開始0～30分：180ml/h、投与始30以降：240ml/h 3及び4回目投与：300ml/h		●							●							●							●						
6	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						

					day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						
2	生食 デキサート	50ml 6.6mg	点滴静注	500ml/h	エンプリシティ投与の45分前までに投与完了	●							●							●							●						
3	生食 ポララミン ガスター	50ml 5mg 20mg	点滴静注	100ml/h	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了	●							●							●							●						
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●							●							●							●						
5	エムプリシティ 注射用水 生食	10mg/kg 0.4ml/kg 250ml（体重50kg未満：150ml、体重50～90kg：250ml、体重90kg超：350ml）	点滴静注	300ml/h		●							●							●							●						
6	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●							●						

					day	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●													
2	生食 デキサート	50ml 6.6mg	点滴静注	500ml/h	エンプリシティ投与の45分前までに投与完了	●														●													
3	生食 ポララミン ガスター	50ml 5mg 20mg	点滴静注	100ml/h	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了	●														●													
4	生食	50ml	点滴静注	200ml/h		●														●													
5	エムプリシティ 注射用水 生食	10mg/kg 0.4ml/kg 250ml（体重50kg未満：150ml、体重50～90kg：250ml、体重90kg超：350ml）	点滴静注	300ml/h		●														●													
6	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	レナリドミド	25mg	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
2	デキサメタゾン	28mg	エンプリシティ投与の3～24時間前			●							●							●							●						
3	アセトアミノフェン	300～1000mg	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了			●							●							●							●						
4	高尿酸血症治療剤					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	感染症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	静脈血栓塞栓症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	レナリドミド	25mg	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
2	デキサメタゾン	28mg	エンプリシティ投与の3～24時間前			●							●							●							●						
3	アセトアミノフェン	300～1000mg	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了			●							●							●							●						
4	高尿酸血症治療剤					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	感染症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	静脈血栓塞栓症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	レナリドミド	25mg	1日1回			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
2	デキサメタゾン	28mg	エンプリシティ投与の3～24時間前			●														●													
3	デキサメタゾン	40mg	エンプリシティ投与の3～24時間前										●														●						
4	アセトアミノフェン	300～1000mg	エンプリシティ投与の45～90分前までに投与完了			●														●													
5	高尿酸血症治療剤					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	感染症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	静脈血栓塞栓症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●