

レジメン名	エリブリン単独療法				
対象がん種	乳がん	対象患者	再発	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無	なし		投与予定回数	なし	
			投与回数上限	なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (Grade ≥ 3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	45.0%
	貧血	2.0%
		0.0%
その他	疲労	9.0%
	末梢神経障害	8.0%
	便秘	1.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													休薬完了
2	デキサート 生食	6.6 mg 50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													
3	ハラヴェン 生食	1.4 mg/m ² 50 ml	点滴静注	500 ml/h			●							●													
4	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

デキサート 生食	6.6 mg 50 ml
-------------	-----------------

100 ml/h

③

ハラヴェン 生食	1.4 mg/m ² 50 ml
-------------	--------------------------------

500 ml/h

④

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

炎症性
フィルター不要
ツグ、ルートともに遮光不要