

| レジメン名 | | GEM+CDDP(隔週) | | | |
|-----------------------|-----|--------------|--|---------|------|
| 対象がん種 | 膵がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 高度 |
| | | | | 1コースの日数 | 14日間 |
| 内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名 | なし | | | 投与予定回数 | PDまで |
| | | | | 投与回数上限 | なし |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | | |
| その他 | | |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 生食 | 50 ml | 点滴静注 | 100 ml/h | | | ● | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 2 | 生食 プリンペラン | 500 ml 10 mg | 点滴静注 | 150 ml/h | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 デキサート プロイメンド | 100 ml 9.9 mg 150 mg | 点滴静注 | 100 ml/h | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食 | 20 ml | 静注 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生食 シスプラチン | Total 150 ml 35 mg/m ² | 点滴静注 | 75ml/h | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生食 ゲムシタピン | 100 ml 1000 mg/m ² | 点滴静注 | 200 ml/h | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|-------|--------|----|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | カイトリル | 2 mg/回 | 内服 | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | デカドロン | 4 mg/回 | 内服 | | | ●● | ●● | | | | | | | | | | | |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

| | |
|----|-------|
| 生食 | 50 ml |
|----|-------|

100 ml/h

②

点滴静注

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 生食 デキサート プロイメンド | 100 ml 9.9 mg 150 mg |
|-----------------------|----------------------------|

100 ml/h

③

静注

| | |
|----|-------|
| 生食 | 20 ml |
|----|-------|

④

点滴静注

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 生食 シスプラチン | Total 150 ml 35 mg/m ² |
|--------------|--------------------------------------|

75ml/h

⑤

点滴静注

| | |
|--------------|----------------------------------|
| 生食 ゲムシタピン | 100 ml 1000 mg/m ² |
|--------------|----------------------------------|

200 ml/h

炎症性

フィルター不要

バッグは遮光、ルートは遮光不要

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

プロイメンドフラッシュ用

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

| | |
|--------------|-----------------|
| 生食 プリンペラン | 500 ml 10 mg |
|--------------|-----------------|

150 ml/h

