

| レジメン名     | (BS) リツキシマブ単剤 (1コース目) |      |  |         |     |
|-----------|-----------------------|------|--|---------|-----|
| 対象がん種     | 悪性リンパ腫                | 対象患者 |  | 催吐リスク   | 最小度 |
|           |                       |      |  | 1コースの日数 | 7   |
| 内服抗がん剤の有無 | なし                    |      |  | 投与予定回数  | 1   |
|           |                       |      |  | 投与回数上限  | 1   |
| ※有の場合薬剤名  |                       |      |  |         |     |

| 副作用情報 (頻度が高い、特徴的な副作用など) |                   |              |               |
|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| 項目                      | 頻度(%)             | 対処法(減量・中止など) |               |
| 血液毒性                    | 好中球減少             | 55.6%        | 休薬、G-CSF      |
|                         | ヘモグロビン減少          | 20.0%        |               |
|                         | 血小板減少             | 15.6%        |               |
| その他                     | infusion reaction | 90.0%        | 中断、ヒドロコルチゾンなど |
|                         |                   |              |               |

レジメン内容(支持療法を含む)

|    |                   |                        |      | day   | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7    |
|----|-------------------|------------------------|------|---|-----------|---|---|---|---|---|------|
| Rp | 薬剤名               | 投与量                    | 投与方法 | 投与速度・時間   | 投与時刻(必要時) |   |   |   |   |   | 休薬完了 |
| 1  | 生理食塩液             | 50mL                   | 点滴静注 | 100mL/hr  |           | ● |   |   |   |   |      |
| 5  | ボラミン<br>生理食塩液     | 5mg<br>50mL            | 点滴静注 | 100mL/hr  |           | ● |   |   |   |   |      |
| 6  | リツキシマブBS<br>生理食塩液 | 375mg/m2<br>337.5mL/m2 | 点滴静注 | 初回50mg/hから<br>開始、医師の指<br>示により30分毎<br>50mg/hずつ上げ<br>て400mg/hまで |           | ● |   |   |   |   |      |
| 7  | 生理食塩液             | 50mL                   | 点滴静注 | 100mL/hr  |           | ● |   |   |   |   |      |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名     | 投与量   | 用法       | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|-------|----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | イブプロフェン | 200mg | リツキサ30分前 |     | ● |   |   |   |   |   |   |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

|       |      |
|-------|------|
| 生理食塩液 | 50mL |
|-------|------|

100 ml/h

②

点滴静注

|               |             |
|---------------|-------------|
| ボラミン<br>生理食塩液 | 5mg<br>50mL |
|---------------|-------------|

100 ml/h

③

点滴静注

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| リツキシマブBS<br>生理食塩液 | 375mg/m2<br>337.5mL/m2 |
|-------------------|------------------------|

備考欄参照

④

点滴静注

|       |      |
|-------|------|
| 生理食塩液 | 50mL |
|-------|------|

100 ml/h

軽度起炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

初回50mg/hから開始、医師の指示によ

り30分毎50mg/hずつ上げて400mg/hま

で