

| レジメン名     | GEM+CDDP20m/m2(2投1休3週コース・補助療法) |      |  |         |      |
|-----------|--------------------------------|------|--|---------|------|
| 対象がん種     | 胆道がん                           | 対象患者 |  | 催吐リスク   | 高度   |
|           |                                |      |  | 1コースの日数 | 21日間 |
|           |                                |      |  | 投与予定回数  | PDまで |
| 内服抗がん剤の有無 | なし                             |      |  | 投与回数上限  | なし   |
| ※有の場合薬剤名  |                                |      |  |         |      |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) |       |              |
|------------------------|-------|--------------|
| 項目                     | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性                   |       |              |
|                        |       |              |
| その他                    |       |              |
|                        |       |              |
|                        |       |              |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名                   | 投与量                                  | 投与方法 | 投与速度・時間  | 投与時刻(必要時) | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   |
|----|-----------------------|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1  | 生食                    | 50 ml                                | 点滴静注 | 200 ml/h |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 休薬完了 |
| 2  | 生食                    | 500 ml                               | 点滴静注 | 250 ml/h |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 3  | 生食<br>デキサート<br>プロイメンド | 100 ml<br>9.9 mg<br>150 mg           | 点滴静注 | 100 ml/h |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 4  | 生食                    | 20 ml                                | 静注   |          |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 5  | 生食<br>シスプラチン          | total 150 ml<br>20 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 75ml/h   |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 6  | 生食<br>ゲムシタピン          | 100 ml<br>800 mg/m <sup>2</sup>      | 点滴静注 | 200 ml/h |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 7  | 生食                    | 500 ml                               | 点滴静注 | 250 ml/h |           |     | ● |   |   |   |   |   |   | ● |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名   | 投与量    | 用法 | day | 1 | 2  | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|----|-------|--------|----|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1  | カイトリル | 2 mg/回 | 内服 |     | ● |    |    |   |   |   |   | ● |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 2  | デカドロン | 4 mg/回 | 内服 |     |   | ●● | ●● |   |   |   |   |   | ●● | ●● |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

|    |          |
|----|----------|
| 生食 | 50 ml    |
|    | 200 ml/h |

②  
点滴静注

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 生食<br>デキサート<br>プロイメンド | 100 ml<br>9.9 mg<br>150 mg |
|                       | 100 ml/h                   |

③  
静注

|    |       |
|----|-------|
| 生食 | 20 ml |
|----|-------|

④  
点滴静注

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| 生食<br>シスプラチン | total 150 ml<br>20 mg/m <sup>2</sup> |
|              | 75 ml/h                              |

⑤  
点滴静注

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 生食<br>ゲムシタピン | 100 ml<br>800 mg/m <sup>2</sup> |
|              | 200 ml/h                        |

炎症性  
フィルター不要  
バッグは遮光、ルートは遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

プロイメンドフラッシュ用

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①  
点滴静注

|    |          |
|----|----------|
| 生食 | 500 ml   |
|    | 250 ml/h |

②  
点滴静注

|    |          |
|----|----------|
| 生食 | 500 ml   |
|    | 250 ml/h |