

レジメン名	TCH（初回導入）				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	高度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名			再発	投与予定回数	1回
				投与回数上限	なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少	9.6%
	好中球減少	65.9%(Grade≥3)
	貧血	5.8%(Grade≥3)
その他	感覚性神経障害	36.0%
	運動性神経障害	4.3%
	筋肉痛	38.9%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●																				休薬完了
2	ハーセプチン 生食	4 mg/kg 250 ml	点滴静注	90分			●																				
2	ハーセプチン 生食	2 mg/kg 250 ml	点滴静注	1時間										●							●						
3	デキサート 生食	6.6 mg 100 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				
4	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
5	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC:6 250 ml	点滴静注	1時間			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	グラニセトロン	2 mg	化学療法前		●																					
2	デカドロン錠	4 mg/回	朝・夕食後			●●	●●																			

day 1 滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

ハーセプチン 生食	4 mg/kg 250 ml
--------------	-------------------

170 ml/h

③

デキサート 生食	6.6 mg 100 ml
-------------	------------------

200 ml/h

④

ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml
-------------------	--------------------------------

1時間

⑤

カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC:6 250 ml
--------------------	-----------------

1時間

軽度炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

起壊死性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

day 8, 15

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

ハーセプチン 生食	2 mg/kg 250 ml
--------------	-------------------

250 ml/h

軽度炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要