

レジメン名	エリブリン+3wトラスツマブ			
対象がん種	乳がん	対象患者	催吐リスク	軽度
			1コースの日数	21日
			投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	
その他	0.0%	
	0.0%	
	0.0%	

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													休薬完了
2	トラスツマブBS 注射用水 生食	6 mg/kg 0.28 ml/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
3	デキサート 生食	6.6 mg 50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													
4	ハラヴェン 生食	1.4 mg/m ² 50 ml	点滴静注	500 ml/h			●							●													
5	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

day 1 滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

トラスツマブBS 注射用水 生食	6 mg/kg 0.28 ml/kg 250 ml
------------------------	---------------------------------

1時間

③

デキサート 生食	6.6 mg 50 ml
-------------	-----------------

100 ml/h

④

ハラヴェン 生食	1.4 mg/m ² 50 ml
-------------	--------------------------------

500 ml/h

⑤

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

軽度炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

day 8

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

デキサート 生食	6.6 mg 50 ml
-------------	-----------------

100 ml/h

③

ハラヴェン 生食	1.4 mg/m ² 50 ml
-------------	--------------------------------

500 ml/h

④

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要