

ID	患者名	性別	生年月日	年齢	身長		体重		体表面積		医師名
					測定日	測定日	測定日	測定日	測定日	測定日	
@PATIENTID	@PATIENTNAME	PATIENTSEI	@PATIENTBIRTH	INTAGEFOR	HEIGHT01_D	cm	HEIGHT01_U	kg	#VALUE!	m <sup>2</sup>	@USERNAME
					\$HEIGHT02	Doc	\$WHEIGHT02	Doc	1900/170		

レジメン名	wPTX80 mg/m <sup>2</sup> 3投1休				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	嘔吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	28日
			再発	投与予定回数	なし
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限		なし
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	発熱性好中球減少	1.0%
	好中球減少	2%(Grade≥3)
		0.0%
その他	筋肉痛	2%(Grade≥3)
	神経障害	8%(Grade≥3)
		0.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●														休薬完了
2	デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml	点滴静注	300 ml/h			●							●							●														
3	生食	50 ml	点滴静注	100 ml/h			●							●							●														
4	バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml	点滴静注	1時間			●							●							●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	なし																																	

滴下順  
主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

デキサート ガスター ボラミン 生食	6.6 mg 20 mg 5 mg 50 ml
-----------------------------	----------------------------------

300 ml/h

③

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

④

バクリタキセル 5%ブドウ糖液	80 mg/m <sup>2</sup> 250 ml
--------------------	--------------------------------

1時間

起壊死性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要