レジメン名	維持療法nivolumab+BEV				
対象がん種	肺がん	対象患者	初発	催吐リスク	最小度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	21
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	42.5%	G-CSF
	貧血	28.6%	輸血
	血小板減少	21.6%	輸血
その他	脱毛	52.4%	
	末梢神経障害	44.0%	適正使用ガイドに準ずる
	皮疹	41.0%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/hr		●																				
2	オプジーボ 生食	360mg 100mL	点滴静注	1hr		●																				
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/hr		●																				
4	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	30min		●																				
5	生食	50mL	点滴静注	200mL/hr		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし																									