

レジメン名	後発CHOP (3週毎)			
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者	催吐リスク	高度
			1コースの日数	21
			投与予定回数	3~8
			投与回数上限	8
内服抗がん剤の有無	あり			
※有の場合薬剤名	プレドニゾン <small>(点滴の場合はなし)</small>			

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	90.0% G-CSF
	貧血	65.0%
	血小板減少	25.0%
その他	末梢神経障害	50.0% VCR減量・中止、薬剤(プレカバリ)
	悪心・嘔吐	42.0% 制吐剤
	便秘	38.0% 下剤

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																					休薬完了	
2	オンコピン 生理食塩液	1.4mg/m2 (最大2mg) 50mL	点滴静注	500mL/hr			●																						
3	ドキシソルピシン 生理食塩液	50mg/m2 100mL	点滴静注	200mL/hr			●																						
4	エンドキサン 生理食塩液	750mg/m2 250mL	点滴静注	250mL/hr			●																						
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr			●																						
内服抗がん剤・支持療法薬																													
Rp	薬剤名	投与量	用法		day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	プレドニゾン	50mg/body or 30mg/m2	朝・昼食後				●●	●●	●●	●●	●●																		
2	グラネセトロンゼリー or カイトリル	2mg	化学療法前				●																						
4	他、適宜ST合剤、G-CSFなど																												

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生理食塩液	50mL
-------	------

100 ml/h

②

点滴静注

オンコピン 生理食塩液	1.4mg/m2 (最大2mg) 50mL
----------------	-----------------------------

500 ml/h

起壊死性
フィルター不可
バッグ、ルートともに遮光不要

③

点滴静注

ドキシソルピシン 生理食塩液	50mg/m2 100mL
-------------------	------------------

200 ml/h

起壊死性
フィルター不可
バッグ、ルートともに遮光不要

④

点滴静注

エンドキサン 生理食塩液	750mg/m2 250mL
-----------------	-------------------

250 ml/h

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤

点滴静注

生理食塩液	50mL
-------	------

100 ml/h