

レジメン名		3wトラスツズマブ初回導入			
対象がん種	乳がん	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21日
				投与予定回数	1回
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性		0.0%
		0.0%
		0.0%
その他	心不全	4.5%
	Infusion reaction	頻度不明
	下痢	36.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50ml	点滴静注	100 ml/h			●																				休薬完了
2	トラスツズマブBS 注射用水 生食	8 mg/kg 0.38 ml/kg 250 ml	点滴静注	90分			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主營

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 ml
----	-------

100 ml/h

②

トラスツズマブBS	8 mg/kg
注射用水	0.38 ml/kg
生食	250 ml

90分

軽度炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要