

レジメン名	ペムプロリズマブ+CBDCA+nab-PTX				
対象がん種	肺がん	対象患者	切除不能進行・再発	嘔吐リスク	中等度
				1コースの日数	21
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし			投与予定回数	4
				投与回数上限	6

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	44.2%
	好中球減少	34.9%
	血小板減少	29.1%
その他	神経系障害	51.1%
	悪心	80.6%
	免疫関連有害事象	-

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了	
2	キイトルーダ 生食	200mg 50mL	点滴静注	30分			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●							●														
4	フロイメンド 生食	150mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																					
5	デキサート アロキシ 生食	4.95mg 0.75mg 50mL	点滴静注	100mL/h			●																					
6	デキサート 生食	6.6mg 50mL	点滴静注	100mL/h										●								●						
7	アブラキサン 生食	100mg/m ² 20mL/m ²	点滴静注	30分			●							●								●						
8	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●							●								●						
9	カルボプラチン 5%ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	1時間			●																					
10	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠	4mg/回	朝食後			●	●																			

滴下順

day1

① 点滴静注

② 点滴静注

③ 点滴静注

④ 点滴静注

⑤ 点滴静注

⑥ 点滴静注

⑦ 点滴静注

⑧ 点滴静注

⑨ 点滴静注

主管 投与方法 薬剤・用量 投与速度/時間 投与時刻(必要時) 漏出時リスク フィルター 遮光 備考	生食 50mL 100 ml/h	キイトルーダ 200mg 生食 50mL 30分 該当分類なし フィルター必要 バッグ、ルートともに遮光不要	生食 50mL 200 ml/h	フロイメンド 150mg 生食 100mL 200 ml/h	デキサート 4.95mg アロキシ 0.75mg 生食 50mL 100 ml/h	アブラキサン 100mg/m ² 生食 20mL/m ² 30分 起壊死性 フィルター不可 バッグ、ルートともに遮光不要 フィルターなしルートへ	生食 50mL 200 ml/h	カルボプラチン AUC=6 5%ブドウ糖注 250mL 1時間 炎症性 フィルター不要 バッグ、ルートともに遮光不要	生食 50mL 200 ml/h
--	---------------------	---	---------------------	--------------------------------------	--	--	---------------------	---	---------------------

day8,15

① 点滴静注

② 点滴静注

③ 点滴静注

④ 点滴静注

主管 投与方法 薬剤・用量 投与速度/時間 投与時刻(必要時) 漏出時リスク フィルター 遮光 備考	生食 50mL 200 ml/h	デキサート 6.6mg 生食 50mL 100 ml/h	アブラキサン 100mg/m ² 生食 20mL/m ² 30分 起壊死性 フィルター不可 バッグ、ルートともに遮光不要	生食 50mL 200 ml/h
--	---------------------	------------------------------------	---	---------------------