レジメン名	RAM+TKI				
対象がん種	肺がん	対象患者	初発	催吐リスク	軽度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	14日
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	なし
※有の場合薬剤名	gefitinibもしくはerlotinib				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	10.0%	延期、減量、輸血
	血小板減少	14.0%	延期、減量、輸血
その他	下痢	70.1%	止痢薬
	口内炎	41.6%	
	悪心	25.8%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時刻(必要時)														休薬完了
1	生理食塩水	50ml	点滴静注	200ml/h		●													
2	生理食塩水 ポララミン	100ml 5mg	点滴静注	200ml/h		●													
3	生理食塩水 サイラムザ	250ml 10mg/kg	点滴静注	1時間 （初回忍容性が良好の場合、2回目以降30分まで短縮可）		●													
4	生理食塩水	100ml	点滴静注	100ml/h (3コース目以降400ml/h)		●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	gefitinib もしくは erlotinib		連日内服			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●