

レジメン名	DOC3週間毎				
対象がん種	前立腺がん	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
内服抗がん剤の有無	あり		投与予定回数	規定なし	
			投与回数上限	規定なし	
※有の場合薬剤名	プレドニゾン				

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血(G3以上)	5.0%
	好中球減少(G3以下)	32.0%
	発熱性好中球減少	3.0%
その他	悪心・嘔吐	42.0%
	下痢	32.0%
	口内炎	20.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了
2	デキササート ボラミン注 生食	6.6mg 5mg 50mL	点滴静注	100mL/h			●																				
3	ドセタキセル 5%ブドウ糖注	75mg/m ² 250mL	点滴静注	250mL/h			●																				
4	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	プレドニゾン錠	5mg/回	1日2回		●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50mL
----	------

100 ml/h

②

点滴静注

デキササート	6.6mg
ボラミン注	5mg
生食	50mL

100 ml/h

③

点滴静注

ドセタキセル	75mg/m ²
5%ブドウ糖注	250mL

250 ml/h

④

点滴静注

生食	50mL
----	------

200 ml/h

フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不