| レジメン名 | バ | バベンチオ+インライタ併用療法 | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|--------|---------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 対象がん種 | 腎細胞がん | 対象患者 | 切除不能進行 | 催吐リスク | 軽度 | | | | | | | | |
| | | | | 1コースの日数 | 14日 | | | | | | | | |
| | | | | 投与予定回数 | | | | | | | | | |
| 内服抗がん剤の有無 | あり | | | 投与回数上限 | なし | | | | | | | | |
| ※有の場合薬剤名 | インライタ |] | | | | | | | | | | | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) | | | | | | | | |
| 血液毒性 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| その他 | 下痢 | 44.6% | Grade1以下になるまで休薬 | | | | | | | | |
| | 高血圧 | 39.2% | Grade1以下になるまで休薬 | | | | | | | | |
| | 疲労 | 33.6% | Grade1以下になるまで休薬 | | | | | | | | |

レジメン内容(支持療法を含む)

| | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 |
|----|-------------------------|------------------|------|---------|-----------|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| ₹p | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度·時間 | 投与時刻(必要時) | | | | | | | | | | | | | | 休薬完 |
| | 1 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | • | | | | | | | | | | | | | |
| : | 2 アセトアミノフェン静注液1000mgバッグ | 1袋 | 点滴静注 | 400mL/h | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 ポララミン注 | 50mL 5mg | 点滴静注 | 100mL/h | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 生食 | 50mL | 点滴静注 | 200mL/h | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 バベンチオ点滴静注 生食 | 10mg/kg 250mL | 点滴静注 | 1時間 | | • | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/h | | • | | | | | | | | | | | | | |

| 시 | 脓抗かん剤・文持漿法楽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Rp | p 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | 1 インライタ錠 | 1回5mg | 1日2回 | | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | •• | |