レジメン名	（BS）R-ベンダムスチン療法				
対象がん種	悪性リンパ腫	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	6～8
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	8
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	64.4%	G-CSF、延期、減量
	リンパ球減少	95.0%	
	血小板減少	53.6%	延期、減量
その他	悪心・嘔吐	86.0%	制吐剤
	皮膚障害	52.6%	ステロイド外用剤
	感染症	36.8%	血液検査、CT検査など

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●																										
2	トレアキシン 生理食塩液	90mg/m2 250mL	点滴静注	1時間		●	●																										
3	ボララミン 生理食塩液	5mg 50mL	点滴静注	100mL/hr		●																											
4	リツキシマブBS 生理食塩液	375mg/m2 337.5mL/m2	点滴静注	【1コース目】 初回50mg/hから開始、医師の指示により30分毎50mg/hずつ上げて400mg/hまで 【2コース目以降】 100mg/hから開始可、医師の指示により30分毎100mg/hずつ上げて400mg/hまで		●																											
5	生理食塩液	50mL	点滴静注	100mL/hr		●	●																										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンゼリー or カイトリル	2mg	化学療法前			●	●																										
2	イブプロフェン	200mg	リツキサン30分前			●																											
3	他、適宜ST合剤、アシクロビルなどの抗ウイルス薬、G-CSFなど																																