

レジメン名	テセントリク(アテゾリズマブ)				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	規定なし
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	規定なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	-	
	-	
	-	
その他	免疫関連有害事象	-
		-
		-

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了
2	テセントリク 生食	1200mg 250mL	点滴静注	270mL/h 2回目以降 500mL/h			●																				
3	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																										

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

テセントリク 1200mg

生食 250mL

備考欄参照

③

静注

生食 50mL

100 ml/h

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不

270mL/h, 2回目以降500mL/h