レジメン名	エンホルツマブ・ベドチン(パドセブ)療法				
対象がん種	尿路上皮癌	対象患者	切除不能進行	催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	PDまで
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	16.6%	G3のときＧ１以下になるまで休薬。
	貧血	11.5%	G3のときＧ１以下になるまで休薬。
	血小板減少	4.1%	G2のときG1以下になるまで休薬
その他	末梢性神経障害	46.3%	Ｇ１になるまで休薬
	高血糖	6.4%	BS250以下になるまで休薬
	重篤な皮膚障害	頻度不明	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	備考（投与時刻、モニターなど）																												休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●													
2	パドセブ 注射用水 生食	1.25mg/kg (max125mg) 0.125mL/kg 50ml	点滴静注	30min		●							●							●													
3	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●													

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																