レジメン名	2コース目Nivolumab+CBDCA+PEM				
対象がん種	肺がん	対象患者	初発	催吐リスク	中等度
			切除不能進行・再発	1コースの日数	21日
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	血液リンパ系障害	31.0%	G-CSF，輸血
その他	皮膚毒性	46.6%	適正使用ガイドに準ずる
	内分泌障害	22.1%	適正使用ガイドに準ずる
	胃腸障害	49.2%	適正使用ガイドに準ずる

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/hr		●																				
2	オプジーボ 生食	360mg 100ml	点滴静注	1時間		●																				
3	生食	50ml	点滴静注	200ml/hr		●																				
4	生食 ブロイメンド	100ml 150mg	点滴静注	200ml/hr		●																				
5	生食	50mL	点滴静注	200ml/hr		●																				
6	生食 デキサート アロキシ	100ml 9.9mg 0.75mg	点滴静注	200ml/hr		●																				
7	生食 アリムタ	100ml 500mg/m2	点滴静注	500ml/hr		●																				
8	ブドウ糖5% カルボプラチン	250ml AUC：6	点滴静注	1時間		●																				
9	生食	50ml	点滴静注	200ml/hr		●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デカドロン錠	4～8mg/day					●●	●●																		