

レジメン名	CBDCA+PTX+BV(ペバシズマブ)(イメンド併用)			
対象がん種	肺がん	対象患者	催吐リスク	高度
			1コースの日数	3週間
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名			投与予定回数	3~4コース
			投与回数上限	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	91.2% G-CSF投与
	血小板減少	4.8% 輸血
その他	高血圧	11.2% 降圧剤の併用
	食欲不振	5.6%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				休業完了	
2	生食 プロイメンド	100mL 150mg	点滴静注	200mL/h			●																					
3	デキサート ガスター ボラミン 生食	9.9mg 20mg 5mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																					
4	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																					
5	バクリタキセル 5% ブドウ糖注	200mg/㎡ 500mL	点滴静注	180mL/h			●																					
6	カルボプラチン 5% ブドウ糖注	AUC=6 250mL	点滴静注	250mL/h			●																					
7	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																					
8	生食 ペバシズマブ	100mL 15mg/kg	点滴静注	初回90分、2回目 60分、3回目以降 30分			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	デカドロン錠	4mg 2錠	朝・昼食後			●●	●●																				

滴下順

主観

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注	
生食	50mL

②

点滴静注	
生食 プロイメンド	100mL 150mg

③

点滴静注	
デキサート ガスター ボラミン 生食	9.9mg 20mg 5mg 100mL

④

点滴静注	
生食	50mL

⑤

点滴静注	
バクリタキセル 5% ブドウ糖注	200mg/㎡ 500mL

⑥

点滴静注	
カルボプラチン 5% ブドウ糖注	AUC=6 250mL

⑦

点滴静注	
生食	50mL

⑧

点滴静注	
生食 ペバシズマブ	100mL 15mg/kg

起壊死性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度起炎症性  
フィルター不要  
バッグ、ルートともに遮光不要  
初回90分、2回目60分、3回目以降30分

備考欄参照