

レジメン名	PER+HER+DOC2回目以降				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無	なし	切除不能進行・再発	投与予定回数	4コース	
※有の場合薬剤名			投与回数上限		

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	52.8%
	発熱性好中球減少	13.8%
		0.0%
その他	下痢	66.8%
	悪心	42.3%
	Infusion reaction	頻度不明

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生理食塩液	50 ml	点滴静注	100 ml/h	投与時刻(必要時)		●																				
2	バージェタ 生理食塩液	420 mg 250 ml	点滴静注	500 ml/h			●																				
3	ハーセプチン 生理食塩液	6 mg/kg 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
4	ボラミン デキサート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				
5	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml	点滴静注	1時間			●																				
6	生理食塩液	50 ml		100 ml/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠	8 mg/日	1日2回		●●		●●	●●																			

滴下順
主管
投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間
投与時刻(必要時)
漏出時リスク
フィルター
遮光
備考

① 点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

② 点滴静注

バージェタ 生理食塩液	420 mg 50 ml
	500 ml/h

③ 点滴静注

ハーセプチン 生理食塩液	6 mg/kg 250 ml
	1時間

④ 点滴静注

ボラミン デキサート 生理食塩液	5 mg 6.6 mg 50 ml
	300 ml/h

⑤ 点滴静注

ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 250 ml
	1時間

⑥ 点滴静注

生理食塩液	50 ml
	100 ml/h

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要