

レジメン名	カドサイラ単独療法				
対象がん種	乳がん	対象患者	切除不能進行・再発	催吐リスク	軽度
			術後化学療法	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無				投与予定回数	なし
				投与回数上限	術後:14回
※有の場合薬剤名					再発:なし

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	2%(Grade $\geq$ 3)
	血小板減少	12.9%(Grade $\geq$ 3)
	貧血	2.7%(Grade $\geq$ 3)
その他	悪心	39.2%
	下痢	23.3%
	AST上昇	22.4%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				休薬完了
2	カドサイラ 生食	3.6 mg/kg 250 ml	点滴静注	初回90分、2回目以降30分まで短縮可能			●																				
3	生食	50 ml	点滴静注	200 ml/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

生食	50 ml
----	-------

200 ml/h

②

カドサイラ 生食	3.6 mg/kg 250 ml
-------------	---------------------

備考欄参照

③

生食	50 ml
----	-------

200 ml/h

炎症性  
フィルター必要  
バッグ、ルートともに遮光不要  
初回90分、2回目以降30分まで短縮可能