

レジメン名	維持アテゾリズマブ+BV(ペバシズマブ)				
対象がん種	肺がん	対象患者	除不能進行・再発	催吐リスク	最小値
				1コースの日数	21
内服抗がん剤の有無 ※有の場合薬剤名	なし		投与予定回数	規定なし	
			投与回数上限	規定なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	-	
	-	
	-	
その他	免疫関連有害事象	-
	出血	-
	高血圧	-

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了	
2	テセントリク 生食	1200mg 250mL	点滴静注	500mL/h			●																					
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					
4	ペバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	30分			●																					
5	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																					

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	なし																										

滴下順
主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

テセントリク 1200mg
生食 250mL

500 ml/h

該当分類なし
フィルター必要
バッグ、ルートともに遮光不要

③

点滴静注

生食 50mL

200 ml/h

④

点滴静注

ペバシズマブ 15mg/kg
生食 100mL

30分

軽度炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

⑤

点滴静注

生食 50mL

200 ml/h