

レジメン名	FOLFOX+Cmab初回用				
対象がん種	大腸がん	対象患者		確吐リスク 1コースの日数 投与予定回数 投与回数上限	中等度 14日間 PDまで なし
内服抗がん剤の有無	なし				
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%) (Grade≧3)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	31.0%
	血小板減少	3.0%
その他	下痢	18.0%
	末梢神経障害	13.0%
	手足症候群	6.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	生食	60 mL	点滴静注	100 mL/h			●							●							休薬完了
2	デキササート ポララミン 生食	9.9 mg 5 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
3	デキササート ポララミン 生食	6.6 mg 5 mg 100 mL	点滴静注	200 mL/h										●							
4	アービタックス 生食	400 mg/m ² 500 mL	点滴静注	2時間			●														
5	アービタックス 生食	250 mg/m ² 250 mL	点滴静注	1時間										●							
6	生食	100 mL	点滴静注	100 mL/h										●							
7	レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注	125 mL/h			●														
8	オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL	点滴静注	2時間			●														
9	フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	200 mL/h			●														
10	フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL	持続静注	46時間			●														

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5-HT3拮抗薬(カイロリル又はアロキシン)		内服or点滴静注			●												
2	デカドロン錠	8mg/day	内服			●●	●●											

滴下順

day1

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②

点滴静注

デキササート ポララミン 生食	9.9 mg 5 mg 100 mL
-----------------------	--------------------------

200 ml/h

③

点滴静注

アービタックス 生食	400 mg/m ² 500 mL
---------------	---------------------------------

2時間

④

点滴静注

オキサリプラチン ブドウ糖注5%	85 mg/m ² 250 mL
---------------------	--------------------------------

2時間

⑤

点滴静注

フルオロウラシル ブドウ糖注5%	400 mg/m ² 50 mL
---------------------	--------------------------------

200 ml/h

⑥

持続静注

フルオロウラシル 生食	2400 mg/m ² 全量100 mL
----------------	------------------------------------

46時間

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
側管①と同時投与

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

側管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

レボホリナート ブドウ糖注5%	200 mg/m ² 250 mL
--------------------	---------------------------------

125 ml/h

主管④と同時投与

滴下順

day8

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	50 mL
----	-------

100 ml/h

②

点滴静注

デキササート ポララミン 生食	6.6 mg 5 mg 100 mL
-----------------------	--------------------------

200 ml/h

③

点滴静注

アービタックス 生食	250 mg/m ² 250 mL
---------------	---------------------------------

1時間

④

点滴静注

生食	100 mL
----	--------

100 ml/h

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要