レジメン名	DBd療法(1コース目のみ)				
対象がん種	多発性骨髄腫	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	1
内服抗がん剤の有無	なし			投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	17.7%	休薬、減量など
	血小板減少	58.8%	休薬、減量など
	貧血	26.3%	
その他	infusion reaction	64.2%	予防薬の使用、中断、中止など
	感染症	67.5%	予防薬の使用、中止など
	末梢性ニューロパ	47.3%	休薬、減量、中止

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																					休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●						
2	生食 デキサート ボララミン	50ml 16.5mg 5mg	点滴静注	500ml/h	ダラザレックス開始	●							●							●						
3	生食	50ml	点滴静注	50ml/h		●							●							●						
4	ダラザレックス 生食	16mg/kg 1000ml（day15は500ml）	点滴静注		初回投与・2回目投与 開始～1時間：50ml/h 1～2時間：100ml/h 2～3時間：150ml/h 3時間以降：200ml/h 3回目投与以降 開始～1時間：100ml/h 1～2時間：150ml/h 2時間以降：200ml/h	●							●												
5	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●							●							●						
6	ベルケイド 生食	1.3mg/㎡ 0.52ml/㎡	皮下注			●			●				●			●										

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	デキサメタゾン	20mg					●		●	●				●		●	●									
2	アセトアミノフェン	650～1000mg				●							●							●						
3	モンテルカスト	10mg				●																				
4	感染症予防薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	高尿酸血症治療薬					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●