

レジメン名	PEM+BV(ペバシズマブ)				
対象がん種	肺がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	3週間毎
				投与予定回数	PDまで継続
内服抗がん剤の有無			投与回数上限		
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	G-CSF投与
	貧血	輸血
	血小板減少	輸血
その他	悪心、嘔吐	制吐剤使用
	疲労	
	高血圧	降圧剤の併用

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				休薬完了
2	デキサート生食	6.6mg 50mL	点滴静注	200mL/h			●																				
3	アリムタ生食	500mg/m ² 100mL	点滴静注	500mL/h			●																				
4	ペバシズマブ生食	15mg/kg 100mL	点滴静注	初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	なし																									

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食	6.6mg 50mL
----	---------------

200 ml/h

②

点滴静注

デキサート生食	6.6mg 50mL
---------	---------------

200 ml/h

③

点滴静注

アリムタ生食	500mg/m ² 100mL
--------	-------------------------------

500 ml/h

④

点滴静注

ペバシズマブ生食	15mg/kg 100mL
----------	------------------

備考欄参照

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要

軽度起炎症性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要
初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与