

レジメン名	維持PEM+Atezolizumab				
対象がん種	肺がん	対象患者	除不能進行・再発	催吐リスク	最小度
				1コースの日数	21
				投与予定回数	規定なし
内服抗がん剤の有無	なし		投与回数上限	規定なし	
※有の場合薬剤名					

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	貧血	16.7%
	好中球減少	6.3%
	血小板減少	4.2%
その他	悪心	25.0%
	発疹	16.7%
	免疫関連有害事象	-

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50mL	点滴静注	100mL/h			●																				休薬完了
2	テセントリク 生食	1200mg 250mL	点滴静注	500mL/h			●																				
3	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				
4	デキサート 生食	6.6mg 100mL	点滴静注	200mL/h			●																				
5	アリムタ 生食	500mg/m ² 100mL	点滴静注	500mL/h			●																				
6	生食	50mL	点滴静注	200mL/h			●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	バンピタン末	1g/day	朝食後		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

生食 50mL

100 ml/h

②

点滴静注

テセントリク 1200mg
生食 250mL

500 ml/h

該当分類なし

フィルター必要

バッグ、ルートともに遮光不要

③

点滴静注

生食 50mL

200 ml/h

④

点滴静注

デキサート 6.6mg
生食 100mL

200 ml/h

⑤

点滴静注

アリムタ 500mg/m²
生食 100mL

500 ml/h

軽度炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要

⑥

点滴静注

生食 50mL

200 ml/h