レジメン名	PLD療法(ドキシル4週毎)				
対象がん種	卵巣がん	対象患者		催吐リスク	軽度
				1コースの日数	28
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無				投与回数上限	
※有の場合薬剤名					

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	35.0%	
	血小板減少	13.0%	
	貧血	36.0%	
その他	脱毛	16.0%	
	手足症候群	49.0%	
	口内炎	40.0%	

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												休薬完了
1	生食	50mL		100mL/h		●																											
2	デキサート 生食	9.9mg 100mL	点滴静注	200mL/h		●																											
3	ドキシル 5%ブドウ糖	50mg/㎡ 250mL	点滴静注	200mL/h		●																											
4	生食	50mL		100mL/h		●																											

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																																