レジメン名	TS-1+イリノテカン(進行再発胃がん)				
対象がん種	胃がん	対象患者		催吐リスク	中等度
				1コースの日数	35日間
				投与予定回数	
内服抗がん剤の有無	あり			投与回数上限	
※有の場合薬剤名	S-1				

副作用情報（頻度が高い、特徴的な副作用など）

項目		頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性			
その他			

レジメン内容（支持療法を含む）

					day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)																												
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h		●														●													
2	ソルデム3A	500ml	点滴静注	170ml/h		●														●													
3	デキサート 生食	9.9mg 100ml	点滴静注	100ml/h		●														●													
4	イリノテカン 生食	100mg/㎡ 250ml	点滴静注	2時間		●														●													

					day	29	30	31	32	33	34	35
Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)							休薬完了
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h								
2	ソルデム3A	500ml	点滴静注	170ml/h								
3	デキサート 生食	9.9mg 100ml	点滴静注	100ml/h								
4	イリノテカン 生食	100mg/㎡ 250ml	点滴静注	2時間								

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	5-HT3阻害薬（アロキシ注、カイトリル錠など）					●																											
2	S-1					●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●						

Rp	薬剤名	投与量	用法		day	29	30	31	32	33	34	35
1	5-HT3阻害薬（アロキシ注、カイトリル錠など）											
2	S-1											