

レジメン名	3wDOC療法				
対象がん種	乳がん	対象患者	術前化学療法	催吐リスク	軽度
			術後化学療法 再発	1コースの日数	21日
内服抗がん剤の有無			投与予定回数	周術期:4コース 再発:なし	
※有の場合薬剤名			投与回数上限	なし	

副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など)		
項目	頻度(%)	対処法(減量・中止など)
血液毒性	好中球減少	93.5%
	発熱性好中球減少	5.7%
		0.0%
その他	悪心	3.1%
	脱毛	91.2%(All grade)
	体液貯留	5.0%

レジメン内容(支持療法を含む)

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度・時間	投与時刻(必要時)	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	生食	50ml	点滴静注	100ml/h				●																				
2	デキサート ポラミン 生食	6.6mg 5mg 50ml	点滴静注	300ml/h				●																				
3	ドセタキセル 5%ブドウ糖注	75mg/m ² 250ml	点滴静注	1時間				●																				

内服抗がん剤・支持療法薬

Rp	薬剤名	投与量	用法	day	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	デカドロン錠4mg	1日2錠	1日2回		●●		●●	●●																			

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①
点滴静注

生食	50 ml
	100 ml/h

②

デキサート ポラミン 生食	6.6mg 5mg 50ml
	300 ml/h

ドセタキセル 5%ブドウ糖注	75mg/m ² 250ml
	1時間

起壊死性
フィルター不要
バッグ、ルートともに遮光不要