

| レジメン名 | 後発GEM(2投1休) | | | | |
|-----------|-------------|------|--|---------|------|
| 対象がん種 | 胆道がん | 対象患者 | | 催吐リスク | 軽度 |
| | 膵がん | | | 1コースの日数 | 21日 |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与予定回数 | PDまで |
| ※有の場合薬剤名 | | | | 投与回数上限 | なし |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | |
|------------------------|-------|--------------|
| 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) |
| 血液毒性 | | |
| | | |
| その他 | | |
| | | |
| | | |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 投与時刻(必要時) | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|--------------|---------------------------------|------|----------|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 1 | 生食 | 50 ml | 点滴静注 | 100 ml/h | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 2 | 生食 ゲムシタピン | 100 ml 1000mg/m ² | 点滴静注 | 200 ml/h | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
|----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滴下順

主管

投与方法

薬剤・用量

投与速度/時間

投与時刻(必要時)

漏出時リスク

フィルター

遮光

備考

①

点滴静注

| | |
|----|-------|
| 生食 | 50 ml |
|----|-------|

100 ml/h

②

点滴静注

| | |
|--------|-----------------------|
| ゲムシタピン | 1000mg/m ² |
| 生食 | 100 ml |

200 ml/h

炎症性

フィルター不要

バッグ、ルートともに遮光不要