

| レジメン名 | キイトルーダ+GC(GEM+CBDCA)療法 (キイトルーダ3週ごと) | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------|-----------|---------|------|
| 対象がん種 | 乳がん | 対象患者 | 切除不能進行・再発 | 催吐リスク | 中等度 |
| | | | | 1コースの日数 | 21日 |
| | | | | 投与予定回数 | PDまで |
| 内服抗がん剤の有無 | なし | | | 投与回数上限 | 無制限 |
| ※有の場合薬剤名 | | | | | |

| 副作用情報(頻度が高い、特徴的な副作用など) | | | |
|------------------------|----------|--------------|-----------------|
| 項目 | 頻度(%) | 対処法(減量・中止など) | |
| 血液毒性 | 好中球減少 | 22.0% | |
| | 貧血 | 48.0% | |
| | 血小板減少 | 19.0% | |
| その他 | 頭痛 | 1%以上 | 鎮痛薬 |
| | 悪心、下痢、嘔吐 | 1%以上 | 整腸剤、制吐薬等 |
| | 呼吸困難 | 1%以上 | 呼吸器内科相談、減量中止を検討 |

レジメン内容(支持療法を含む)

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 投与方法 | 投与速度・時間 | 備考(投与時刻、モニターなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|-------------------|--------------------------------|------|----------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | キイトルーダ 生食 | 200mg 50mL | 点滴静注 | 30min | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | デキサート 生食 | 6.6mg 100mL | 点滴静注 | 200mL/hr | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ゲムシタピン 生食 | 1000mg/m ² 100mL | 点滴静注 | 30min | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | カルボプラチン 5%ブドウ糖 | AUC=2 250mL | 点滴静注 | 1hr | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 生食 | 50mL | 点滴静注 | 100mL/hr | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |

内服抗がん剤・支持療法薬

| Rp | 薬剤名 | 投与量 | 用法 | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----|------------|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | グラニセトロンゼリー | 2mg/回 | 化学療法前 | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |

滴下順 day1(Pembrolizumab,GEM,CBDCA投与日)

| | | | | | | | |
|-----------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 主管 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| 投与方法 | 点滴静注 | 静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 |
| 薬剤・用量 | 生食 50mL | キイトルーダ 200mg 生食 50mL | 生食 50mL | デキサート 6.6mg 生食 100mL | ゲムシタピン 1000mg/m ² 生食 100mL | カルボプラチン AUC=2 5%ブドウ糖注 250mL | 生食 50mL |
| 投与速度/時間 | 100 ml/h | 30分 | 100 ml/h | 200 ml/h | 30分 | 60分 | 100 ml/h |
| 投与時刻(必要時) | | | | | | | |
| 漏出時リスク | | 該当分類なし | | | | 炎症性 | 炎症性 |
| フィルター | | フィルター必要 | | | | フィルター不要 | フィルター不要 |
| 遮光 | | バッグ、ルートともに遮光不要 | | | | バッグ、ルートともに遮光不要 | バッグ、ルートともに遮光不要 |
| 備考 | | | | | | | |

滴下順 day8(GEM,CBDCA投与日)

| | | | | | |
|-----------|----------|-------------------------|--|--------------------------------|----------|
| 主管 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| 投与方法 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 | 点滴静注 |
| 薬剤・用量 | 生食 50mL | デキサート 6.6mg 生食 100mL | ゲムシタピン 1000mg/m ² 生食 100mL | カルボプラチン AUC=2 5%ブドウ糖注 250mL | 生食 50mL |
| 投与速度/時間 | 100 ml/h | 200 ml/h | 30分 | 60分 | 100 ml/h |
| 投与時刻(必要時) | | | | | |
| 漏出時リスク | | | 炎症性 | 炎症性 | |
| フィルター | | | フィルター不要 | フィルター不要 | |
| 遮光 | | | バッグ、ルートともに遮光不要 | バッグ、ルートともに遮光不要 | |
| 備考 | | | | | |